

Projekt Slagtelams Klimaaftryk



Dataindsamling & Besætningsnøgletal

Kirstine Flintholm Jørgensen

mail: kirstinefj@hotmail.com

Team Fårerådgivning

www.teamfaareraadgivning.dk

Registreringer

Produktionsår 2020

9 bedrifter

- Type bedrift, årshjul
- Formål med fåreholdet
- Race og kropsvægt
- Ind- og udgang af dyr (født, indkøb, død/slagtet/solgt)

Input gennem et produktionsår

- Foder , eget + indkøbt
- Afgræsningsareal og dyretryk
- Gødning, brændstof, el



Registreringer

Output gennem et produktionsår

- Antal dyr; fødte, fravænnede, slagtede, solgt til levebrug
- Kg fravænnet + slagtet, pris
- Uld, kg og anvendelse, pris
- Skind. Stk, pris



Forskellige typer besætninger

	Type
1	Udelukkende naturafræsning om sommeren kombineret med afgræsning på efterslæt fra slætmarker/frøgræsmarker fra oktober til maj. Der er udelæmninger
2	Naturafræsning kombineret med afgræsning på efterslæt fra slætmarker/frøgræsmarker. Læmning på stald og staldfodring med primært græsensilage i ca. 2 mdr.
3	Afgræsning på græs udlagt i omdriftsarealer og større andel tilskudsfodring med korn og proteinfoder
4	Bedrifter hvor salg af uld/skind er betydende for driftsøkonomien, og fodring sker med større andel tilskudsfodring



Metode- beregning af antal årsfår

Beregnes som summen af foderdage for besætningens voksne får, samt tillægsgimmere født i 2019

- Antal årsfår = Sum af foderdage/365



Metode- beregning af foderbehov

Fodernormer til får (Håndbog for Driftsplanlægning, 2014)

Foderbehovet

- FE Vedligehold udfra kropsvægt
- + Drægtighed i de sidste 49 dage af drægtigheden [+ 0,2 FE pr lam]
- + Diegivning [+ 0,7, + 1,1, +1,5 FE for 1, 2, 3 lam]
- **Tillægsgimmere** født 2019 beregnes som voksne får
- **Lam:** Vedligehold + tilvækst efter fravænning [4 FE pr kg tilvækst]

Det totale foderbehov beregnes med en fodereffektivitet på 87 %.

Det vil sige FE behovet divideres med 0,87

Besætninger



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Antal årsfår	10-100	10-100	10-100	10-100	100-400	100-400	100-400	>400	> 400
Bedriftstype	Øko		Hobby	Hobby 8 mdr. mell. læmn.	Læmmer ude	Natur- pleje Øko	Læmmer hele året	Natur- pleje Læmmer ude	Natur- pleje Læmmer ude
Omsætning udover lammekød	Skind Uld Avlsdyr	Skind Uld Avlsdyr	Avlsdyr	Avlsdyr		Skind Uld	Uld	Uld Avlsdyr	Uld
Afgræsser primært ¹⁾	Sædskifte	Sædskifte	Sædskifte	Efterslæt og natur	Efterslæt og natur	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Efterslæt og natur

Besætninger



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bedriftstype	Øko		Hobby	Hobby 8 mdr. mell. læmn.	Læmmer ude	Natur- pleje Øko	Læmmer hele året	Natur- pleje Læmmer ude	Natur- pleje Læmmer ude
Omsætning udover lammekød	Skind Uld Avlsdyr	Skind Uld Avlsdyr	Avlsdyr	Avlsdyr		Skind Uld	Uld	Uld Avlsdyr	Uld
Afgræsser primært ¹⁾	Sædskiye	Sædskiye	Sædskiye	Efterslæt og natur	Efterslæt og natur	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Efterslæt og natur
Kg, Moderfår	65	65	75	75	67	82	70	80	65
Antal læmninger pr årsfår	1,03	1,10	1,04	1,19	0,96	0,56	1,05	0,97	0,69

Besætninger



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bedriftstype	Øko		Hobby	Hobby 8 mdr. mell. læmn.	Læmmer ude	Natur- pleje Øko	Læmmer hele året	Natur- pleje Læmmer ude	Natur- pleje Læmmer ude
Omsætning udover lammekød	Skind Uld Avlsdyr	Skind Uld Avlsdyr	Avlsdyr	Avlsdyr		Skind Uld	Uld	Uld Avlsdyr	Uld
Afgræsser primært ¹⁾	Sædskiye	Sædskiye	Sædskiye	Efterslæt og natur	Efterslæt og natur	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Natur og efterslæt	Efterslæt og natur
Kg, Moderfår	65	65	75	75	67	82	70	80	65
Antal læmninger pr årsfår	1,03	1,10	1,04	1,19	0,96	0,56	1,05	0,97	0,69
Antal levende- fødte pr årsfår	2,05	1,92	1,98	2,32	1,55	1,15	1,56	1,58	0,92

Besætninger



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Antal levende- fødte pr årsfår	2,05	1,92	1,98	2,32	1,55	1,15	1,56	1,58	0,92
Antal levendefødte pr MF der læmmer	1,98	1,74	1,90	2,79	1,62	2,04	1,48	1,64	1,33



Besætninger

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tillæg ¹⁾	16,3	32,9	50	18,5	31	9,8	11,2	29,5	22,7
% døde lam af levendefødte	2,2	10,7	0	5,1	9,7	9,8	7,0	2,8	3,6
Alder v. 1. læmning, mdr.	12	12	12	18	12	24	12	12	24

Besætninger

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tillæg ¹⁾	16,3	32,9	50	18,5	31	9,8	11,2	29,5	22,7
% døde lam af levendefødte	2,2	10,7	0	5,1	9,7	9,8	7,0	2,8	3,6
Alder v. 1. læmning, mdr.	12	12	12	18	12	24	12	12	24

Besætninger

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
% tillæg ¹⁾	16,3	32,9	50	18,5	31	9,8	11,2	29,5	22,7
% døde lam af levendefødte	2,2	10,7	0	5,1	9,7	9,8	7,0	2,8	3,6
Alder v. 1. læmning, mdr.	12	12	12	18	12	24	12	12	24



Produktionsnøgletal - Lam

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lam									
Tilvækst, fødsel til fravænning, g/dag	214	297	279	289	293	255	272	301	254
Tilvækst, fravænning til slagt, g/dag	109	201	256	154	208	151	168	195	93
Alder v. frav., dage	158	104	61	99	83	127	68	101	82
Alder v. slagtn., dage	175	178	166	201	221	203	203	145	405
Vægt, kg lev. v. slagt	39	51	51	50	57	53	46	46	55



Produktionsnøgletal - Lam

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lam									
Tilvækst, fødsel til fravænning, g/dag	214	297	279	289	293	255	272	301	254
Tilvækst, fravænning til slagt, g/dag	109	201	256	154	208	151	168	195	93
Alder v. frav., dage	158	104	61	99	83	127	68	101	82
Alder v. slagtn., dage	175	178	166	201	221	203	203	145	405
Vægt, kg lev. v. slagt	39	51	51	50	57	53	46	46	55

Produktionsnøgletal - Lam

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lam									
Tilvækst, fødsel til fravænning, g/dag	214	297	279	289	293	255	272	301	254
Tilvækst, fravænning til slagt, g/dag	109	201	256	154	208	151	168	195	93
Alder v. frav., dage	158	104	61	99	83	127	68	101	82
Alder v. slagtn., dage	175	178	166	201	221	203	203	145	405
Vægt, kg lev. v. slagt	39	51	51	50	57	53	46	46	55

Produktionsnøgletal - Lam

Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lam									
Tilvækst, fødsel til fravænning, g/dag	214	297	279	289	293	255	272	301	254
Tilvækst, fravænning til slagt, g/dag	109	201	256	154	208	151	168	195	93
Alder v. frav., dage	158	104	61	99	83	127	68	101	82
Alder v. slagtn., dage	175	178	166	201	221	203	203	145	405
Vægt, kg lev. v. slagt	39	51	51	50	57	53	46	46	55

Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9



Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9



Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9

Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9

Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9

Produktionsnøgletal- Foderforbrug


Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9

Produktionsnøgletal- Foderforbrug

Foderforbrug (Foderenheder, FE)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE pr årsfår	686	871	1004	858	642	639	894	745	688
FE suppleringsfoder 1), % pr årsfår	7	30	5	20	0	0,3	16	1	5
FE Afgræsning, % pr årsfår	61	47	43	69	98	77	36	99	91
FE lam, % pr årsfår	12	37	15	27	15	19	37	24	19
FE fjorlam til slagt, % af FE pr årsfår	0	0	0	8	10	1	7	5	18
FE pr kg tilvækst (lam+får)	8,8	8,9	8,3	8,8	10,0	10,0	13,0	9,3	15,9



Produktionsnøgletal - Afgræsning



Produktionsnøgletal- Produktion pr årsfår+ priser? Skal det med her?



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktion pr årsfår									
Lam, kg levende	69	68	79	92	48	50	66	60	33
Får, kg levende	10	30	42	5	16	14	3	19	10
Skind, stk.	1,7	1,2	0	0	0	0,1	0	0	0
Uld, kg	6	6	0	0	0	3	2	3	4

Produktionsnøgletal- Produktion pr årsfår+ priser? Skal det med her?



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produktion pr årsfår									
Lam, kg levende	69	68	79	92	48	50	66	60	33
Får, kg levende	10	30	42	5	16	14	3	19	10
Skind, stk.	1,7	1,2	0	0	0	0,1	0	0	0
Uld, kg	6	6	0	0	0	3	2	3	4
Værdi, kroner									
Lam, pr kg levende	20,24	18,33	26,50	18,36	17,17	19,25	18,73	18,91	18,70
Får, pr kg levende	14,40	12,50	17,36	4,67	7,99	6,11	5,38	6,24	8,33
Skind, pr stk	300	300				300			
Uld, pr kg	17,64	17,00				17,00	2,00	2,08	8,67

Foderforbrug- FE afgræsning sum af FE, hvor fårenes afgræsning har en nytteværdi



Besætning	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FE SUM overskudsgræs/ entreprenørgræs/ naturpleje mv., hvor fårene har en nyttig funktion	13,1	5,3	0,0	63,3	97,6	66,3	29,4	81,2	84,9

Projekt Slagtelams Klimaaftryk



Sådan sænker du klimabelastningen

Kirstine Flintholm Jørgensen

mail: kirstinefj@hotmail.com

Team Fårerådgivning

www.teamfaareraadgivning.dk



”Management praksis som fører til et bedre output uden at ændre væsentligt på fårenes behov til vedligehold vil have den største indvirkning på klimaaftrykket pr kg solgt produkt ”

Modellering af effekter New Zealand, græsbaseret system	Reduktion i metan udskilt pr afsat lam
Ilægning af gimmerlam fremfor 1. års	-13,6 %
Øge scannings % fra 160 til 180	-7,8 %
Øget holdbarhed- MFs alder ved udsætning øget fra 5 til 6 år	-6,4 %
10 % lavere kropsvægt hos MF	-3,9 %
10 % højere tilvækst hos lam	-2,6 %

(Cruickshank et al., 2008)

UK Projekt med data fra 64 fårebedrifter



De 4 parametre der havde størst betydning for klimaaftrykket pr afsat lam

- Antal lam opdrættet pr får
- Lams tilvækst (g/dag)
- Andel af får og tillæg, som ikke ilæmmes (%)
- Tilskudsfoder, kg pr dyreenhed

(Jones et al., Agr. Systems, 2013)

Bedre fodereffektivitet

Projekt Slagtelams klimaaftryk: 5% lavere foderforbrug vil kunne sænke klimaaftrykket pr kg lammekød med mellem 4-6 %



- Bedre fodereffektivitet- flere kg lam pr FE
 - Fødselsvægt
 - Mælkeydelse
 - Bedre græs/foder
 - Tilskudsfodring
 - **Parasitbelastning**
 - Genetik
 - Udvælgelse til slagt- vurdering af dyr som er slagteklar
 - Spild
- Huld, fodring under drægtighed og i lakt., sundhed, race

Bedre tilvækst




- Lav fødselsvægt- de henter det ikke!

Bedre tilvækst



- Lav fødselsvægt- de henter det ikke!
- Udnyt potentialiet i mælkeperioden



Bedre tilvækst



- Lav fødselsvægt- de henter det ikke!
- Udnyt potentialiet i mælkeperioden
- Godt græs efter fravænning



Bedre tilvækst



- Lav fødselsvægt- de henter det ikke!
- Udnyt potentialiet i mælkeperioden
- Godt græs efter fravænning
 - Kløver, lucerne, cikorie, lancet vejbred for bedre tilvækst
 - Tanninholdige urter hæmmer parasitter fx cikorier
 - Mindre N- behov
 - Dybere rodnet
 - Græsmanagement
 - Græstilbud, kvalitet, foldskifte

Bedre tilvækst



- Lav fødselsvægt- de henter det ikke!
- Udnyt potentialet i mælkeperioden
- Godt græs efter fravænning
 - Kløver, lucerne, cikorie, lancet vejbred for bedre tilvækst
 - Tanninholdige urter hæmmer parasitter fx cikorier
 - Mindre N- behov
 - Dybere rodnet
 - Græsmanagement
 - Græstilbud, kvalitet, foldskifte

• Parasitter

Parasitter



- Rene marker!
- Undgå overgræsning
- Foldskifte- under hensyntagen til parasitters cyklus
- Gødningsprøver og rettidigt indsats


Fodring der reducerer klimaaftrykket



- Bedre grovfoderkvalitet
- Protein- energi balance- undgå under-/overforsyning
 - Grovfoderanalyser
- Brug af biprodukter, lokale råvarer


Klimaaftryk hjemmeavlet foder

(sorteret efter CF før C i jord)




Klimaaftrek hjemmeavlet foder II

(sorteret efter CF incl. C i jord)



Klimaaftryk indkøbt foder

(sorteret efter CF før C i jord)



Fodring der reducerer klimaaftrykket



- Bedre grovfoderkvalitet
- [Høj stivelse]
- Protein- energi balance- undgå under-/overforsyning
 - Grovfoderanalyser
- Brug af biprodukter, lokale råvarer
- Foderadditiver
 - Naturlige: Fedt, evt. tanniner
 - Ikke- naturlige/kemiske

Selektion af dyr



- Performance checkpoints: Moderegenskaber, kg lam ved 100 dage. Kg lam fravænnnet.
- Sundhed (resistens for orm/andre sygdomme?)
- Størrelse, evne til at omsætte grovfoder, lavt foderforbrug og lav metanudskillelse uden ringere produktion, fedtmarmorering
- Langsigtet avlsarbejde- kræver **systematiske registreringer** fx suppleret med teknologiske løsninger; digital billedbestemmelse af fedtmarmorering i rygmusklen, genomisk selektion?

Klimaforanstaltningar för svenske svine, kvæg og fårebedrifter



HANDLINGSPLAN
GRIS • NÖT • LAMM

KLIMATÅTGÄRDER.

för svenska gris-, nöt- och lammgårdar.

Vår vision är att öka efterfrågan på gris-, nöt- och lammkött från Sverige.

Vår mission är att bidra till en mer hållbar värld.

Skrevet av Theres Strand, Johanna Bengtsson och Lina Hidas, Svenska Köttföretagen. Inom Handlingsplan Gris, Nöt och Lamm etapp 2. Publicerad i maj 2021.

De tio viktigaste klimatåtgärderna för lammgårdar.

Alla åtgärder som ingår på listan över de tio effektivaste klimatåtgärderna har värderats med poäng 5 när det gäller minskning av klimatgaser från gården. Hur åtgärderna sedan har rankats på listan beror på den sammanlagda totalpoängen för hur lätta de är att genomföra på gård, hur stor investeringskostnaden är och hur lönsamt åtgärden är.

1. Arbeta strategiskt med bekämpning av parasiter
2. Utfodra efter djurens behov och kapacitet genom att analysera valfodret och beräkna balanserade foderstater utifrån analyserna
3. Minska spilt vid lagring och utfodring
4. Arbeta för en god djurhälsa, hög överlevnad och hållbara djur
5. Slakta vid optimal tidpunkt
6. Tillämpa ett strikt smittskydd
7. Arbeta strategiskt för att gårdens betesmarker ska ge bästa avkastning
8. Tillämpa ett långsiktigt avelsarbete
9. Säkerställ hög daglig tillväxt hos växande lamm
10. Ombesörj snabb utgång av improduktiva djur samt fler lamm avandade per tacka

Positiv påverkan på biologisk mångfald

Klimatåtgärder lamm sorterade efter totalpoäng	Positiv påverkan biologisk mångfald	Orsake	Effekt på utsläpp av klimatgaser (5 poäng indikerar en stor minskning)	Genomsnittligt på god (5 poäng indikerar att det är lätt att genomföra)	Investeringskostnad (5 poäng indikerar en hög kostnad)	Lönsamhet (5 poäng indikerar en hög lönsamhet)	Totalpoäng
Ha en strategi för bekämpning av parasiter	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,1	4,0	5,0	18,1
Analysera grovfodret och vädra foderstater	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,9	3,5	4,6	18,0
Minska foderspill	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,1	4,9	17,2
Bra köthälsa	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,6	3,7	4,9	17,2
God djurhälsa	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,1	5,0	17,1
Hög överlevnad hos lamm	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,1	5,0	17,1
Slakta vid optimal tidpunkt	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,9	3,4	4,8	17,1
Minskade lagringsförluster för ensilage	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,4	3,0	4,6	17,0
Rätt grovfoder till rätt djurkategori	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,4	3,1	4,5	17,0
Hög smittskydd	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,3	3,0	4,7	17,0
Rätt proteininnehåll till rätt djurkategori	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,4	4,5	16,9
Effektiv uppfödning inom varje produktionsmodell	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,2	4,7	16,9
Ha en strategi för dina betesmarker för bästa avkastning	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	4,0	3,3	4,5	16,8
Långsiktigt avelsarbete	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,7	3,4	4,6	16,7
Hög tillväxt	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,9	2,9	4,7	16,5
Ökad resurseffektivitet i hela uppfödningen	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,6	3,6	4,3	16,5
Fleråriga vallar bra för markskötet	Uppökning	Foderproduktion	5	4,6	3,4	2,9	15,9
Minska andelen ohälsiga slaktade tackor	Uppökning	Hög resurseffektivitet	5	3,0	3,3	4,3	15,6
Gå med i Grippe Nätverket	Uppökning	Övrigt	5	3,9	3,7	2,9	15,5

- [Klimatåtgärder för svenska gris-, nöt och lammgårdar - Svenska Köttföretagen AB \(kottforetagen.se\)](https://kottforetagen.se)

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Visste du att det gör skillnad när du väljer svenskt lammkött – både för miljön och djuren. Får och lamm är utmärkta naturvårdare. De äter gärna sly och buskar så att landskapen hålls öppna och vackra. Det gör i sin tur att blommor, fåglar och insekter kan leva gott. Svenska får gör helt enkelt en stor insats för att berika den biologiska mångfalden när det betar.



6 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA SVENSKT LAMMKÖTT



De svenska djurskyddslagarna är mer ambitiösa än i de länder vi importerar lammkött från.



Svenska får och lamm äter närproducerat foder – ingen soja från skövlad regnskog.



Svenskt lammkött har lägre klimatpåverkan jämfört med importerat kött.



Får och lamm vårdar landskap och betesmarker. De hjälper till att stärka den biologiska mångfalden så vi kan klara miljömålet om ett rikt odlingslandskap



Utan får och lamm skulle stora arealer växa igen med sly och skog och det öppna landskapet förslummas.



För att bli mer självförsörjande samt mindre sårbara och beroende av importerad mat, skulle vi behöva öka produktionen av lammkött i Sverige.

Varför ska man välja svenskt lammkött?

Visste du att det gör skillnad när du väljer svenskt lammkött – både för miljön och djuren. Får och lamm är utmärkta naturvårdare. De äter gärna sly och buskar så att landskapen hålls öppna och vackra. Det gör i sin tur att blommor, fåglar och insekter kan leva gott. Svenska får gör helt enkelt en stor insats för att berika den biologiska mångfalden när det betar.



6 ANLEDNINGAR ATT VÄLJA SVENSKT LAMMKÖTT

Dyrevelsfærd • Nærproduceret foder • Lavere klimaaftryk end importeret lam • Biodiversitet • Naturpleje-lysåbne arealer • National selvforsyning



De svenska djurskyddslagarna är mer ambitiösa än i de länder vi importerar lammkött från.



Svenska får och lamm äter närproducerat foder – ingen soja från skövlad regnskog.



Svenskt lammkött har lägre klimatpåverkan jämfört med importerat kött.



Får och lamm vårdar landskap och betesmarker. De hjälper till att stärka den biologiska mångfalden så vi kan klara miljömålet om ett rikt odlingslandskap



Utan får och lamm skulle stora arealer växa igen med sly och skog och det öppna landskapet förslummas.



För att bli mer självförsörjande samt mindre sårbara och beroende av importerad mat, skulle vi behöva öka produktionen av lammkött i Sverige.

Danske lam??

- Naturpleje
- Biodiversitet
- Dyrevelfærd
- Høj andel græs
- Lav andel tilskudsfoder- men ikke uden soja!
- Ensartet kvalitetskød??
- Lav klimabelastning??